

# ENGORDE A CORRAL

La Nación. 1999. Secc. Noticias, Bs. As., 20.02.99.  
[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

[Volver a: Carpinchos](#)

Los investigadores están resolviendo paulatinamente los inconvenientes de la cría del **carpincho** en cautiverio. Para iniciar el criadero fue necesario, primero, capturar animales silvestres, previa autorización del gobierno correntino. Al principio hubo problemas de adaptación, que causó mucha mortandad y muy baja tasa de reproducción.

"Desde hace alrededor de un año resolvimos el problema de la reproducción. Cambiamos la dieta y logramos dos pariciones al año, con 4 o 5 crías", dijo el biólogo Gerardo Cueto, becario del Conicet.

"Lo que tenemos que estudiar ahora es cómo engordarlos de una forma más económica", continuó. Estos animales comen 3 kilos de pasto por día, lo cual es mucho si se trata de un centenar de cabezas. Entonces el pasto fue reemplazado por un alimento balanceado para conejos, pero resultó muy costoso. Lo que proponen los investigadores es el pastoreo, durante un año, en el campo, como si fueran ovejas. Transcurrido ese lapso, se pueden enviar algunos al matadero.

Los investigadores indican que para tener un criadero los productores deben empezar con un macho y 5 ó 6 hembras.

[Volver a: Carpinchos](#)