

# ¿QUÉ NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN ESPECIALES TIENEN LOS CABALLOS CON LAMINITIS?

Joaquín Ventura García. 2014. PV ARGOS 30/2014.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Enfermedades de los equinos](#)



(Foto: Montanabw - CC License)

Los caballos que sufren laminitis tienen que sacarse del pasto y alimentarse con una dieta especial, baja en carbohidratos no estructurales. El heno de alfalfa es un buen ingrediente para la alimentación de estos animales durante la fase aguda del problema.

La laminitis es un problema inflamatorio muy doloroso y bastante grave que afecta a los tejidos que conectan la muralla y las estructuras blandas del casco. Se trata de una enfermedad de origen multifactorial y uno de los factores que ayudan a que se desencadene es una excesiva cantidad de carbohidratos no estructurales en la dieta del caballo. Además, los équidos con síndrome metabólico o enfermedad de Cushing la sufren con más frecuencia.

Una noticia publicada en [EquineNews.com](http://EquineNews.com) señala que es recomendable una restricción en la cantidad de carbohidratos no estructurales del alimento de caballos que estén sufriendo laminitis en su fase aguda. La dieta debe contener heno con baja proporción de estos carbohidratos (1,5-2 % del peso del animal). El heno de alfalfa es un ingrediente adecuado para estas dietas que pueden completarse con salvado, pulpa de remolacha o cáscara de soja para aportar la fibra necesaria.

Si el animal necesita perder peso, mejor esperar a que supere la laminitis, ya que durante la enfermedad necesita recibir alimentos de calidad y una dieta balanceada, sin déficits de ningún tipo.

Aunque no hay literatura científica que la respalde, se ha comprobado empíricamente que los caballos con laminitis pueden beneficiarse de un incremento de la cantidad de biotina (15 a 30 mg/día), cinc y metionina en la dieta, que mejoran el crecimiento de la muralla del casco. Si la velocidad de crecimiento de la muralla aumenta, se consigue que vuelva a tener una conformación adecuada más rápidamente tras el episodio de laminitis.

También es recomendable mantener altos niveles de ingestión de vitamina E, ya que el estrés oxidativo es otro factor que interviene en la aparición de laminitis.

Volver a: [Enfermedades de los equinos](#)